

6.泌尿器

6-1 腎癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類
Nivolumab	ニボルマブ	Nivo: 240mg	d1	14日間	最小度
Nivolumab 4週ごと	ニボルマブ	Nivo: 480mg	d1	28日間	最小度
Nivolumab+Ipilimumab	ニボルマブ イピリムマブ	Nivo: 240mg Ipilimumab: 1mg/kg	d1 d1	21日間	最小度
Temsirolimus	テムシロリムス	Temsirolimus: 25mg	d1	7日間	最小度

6-2 前立腺癌

6-2-1 ホルモン療法

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類
22.5mgリュープリンプロレリン酢酸塩	リュープロレリン	22.5mg	d1	24週	-

6-2-1 化学療法

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類
CBZ	カバジタキセル	20mg/m ²	d1	21日間	軽度
DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	d1	21日間	軽度

6-3 尿路上皮癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類
GC GC sh.ver	ゲムシタビン シスプラチン	GEM: 1000mg/m ² CDDP: 70mg/m ²	d1.8 d2	21日間	d1.8: 軽度 d2: 高度
GCarbo 入院 GCarbo 外来	ゲムシタビン カルボプラチン	GEM: 1000mg/m ² CBDCA: AUC5	d1.8 d1	14日間	d1: 中等度 d8: 軽度
M-VAC	メトレキサート ビンブラスチン ドキソルビシン シスプラチン	MTX: 30mg/m ² VLB: 3mg/m ² ADM: 30mg/m ² CDDP: 70mg/m ²	d1.15.22 d2.15.22 d2 d2	28日間	高度
ペムプロリズマブ	ペムプロリズマブ	200mg	d1	21日間	-
ペムプロリズマブ 6週ごと	ペムプロリズマブ	400mg	d1	42日間	-

6-4 精巣癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類
BEP	ブレオマイシン イトホシド シスプラチン	BLM: 30mg/body VP-16: 100mg/m ² CDDP: 20mg/m ²	d1.8.15 d1-5 d1-5	21日間	高度
EP	イトホシド シスプラチン	VP-16: 100mg/m ² CDDP: 20mg/m ²	d1-5 d1-5	21日間	高度
VIP	イトホシド イホスファミド シスプラチン	VP-16: 75mg/m ² IFM: 1200mg/m ² CDDP: 20mg/m ²	d1-5 d1-5 d1-5	21日間	高度