

7.頭頸部癌

| レジメン名 | 一般名 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 催吐リスク分類 |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------|------|---------|
| Cmab 1回目 Cmab 2回目以降 | セツキシマブ | C-mab: (初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² | day1 | 7日間 | 最小度 |
| Cmab+FP CBDCA 1コース目 Cmab+FP CBDCA 2-6コース目 | セツキシマブ カルボプラチン フルオロウラシル | C-mab: (初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² CBDCA: AUC5 5-FU: 1000mg/m ² | day1.8.15 day1 day1-4 | 21日間 | 中等度 |
| Cmab+FP CDDP 1コース目 Cmab+FP CDDP 2-6コース目 | セツキシマブ シスプラチン フルオロウラシル | C-mab: (初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² CDDP: 100mg/m ² 5-FU: 1000mg/m ² | day1.8.15 day1 day1-4 | 21日間 | 高度 |
| FP | シスプラチン フルオロウラシル | CDDP: 100mg/m ² 5-FU: 1000mg/m ² | day1 day1-4 | 21日間 | 高度 |
| PCE 1コース目 PCE 2-6コース目 PCE 維持療法 (Cmab単剤) | セツキシマブ パクリタキセル カルボプラチン | C-mab: (初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² PTX: 100mg/m ² CBDCA: AUC2.5 | day1.8.15 day1.8 day1.8 | 21日間 | 中等度 |
| PTX+Cmab 1回目 PTX+Cmab 2回目以降 | セツキシマブ パクリタキセル | C-mab: (初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² PTX: 80mg/m ² | day1 | 7日間 | 軽度 |
| ニボルマブ | ニボルマブ | Nivo:240mg | day1 | 14日間 | - |
| ペムブロリズマブ | ペムブロリズマブ | ペムブロリズマブ: 200mg | d1 | 21日間 | - |
| ペムブロリズマブ+CBDCA+5FU | ペムブロリズマブ カルボプラチン フルオロウラシル | ペムブロリズマブ: 200mg CBDCA: AUC5 5-FU: 1000mg/m ² | d1 d1 d1-4 | 21日間 | 中等度 |
| ペムブロリズマブ+CDDP+5FU | ペムブロリズマブ シスプラチン フルオロウラシル | ペムブロリズマブ: 200mg CDDP: 100mg/m ² 5-FU: 1000mg/m ² | d1 d1 d1-4 | 21日間 | 高度 |
| 放射線併用CDDP 放射線併用CDDP sh.ver | シスプラチン | CDDP: 100mg/m ² | day1 | 21日間 | 高度 |
| 放射線併用Cmab 1回目 放射線併用Cmab 2回目以降 | セツキシマブ | C-mab: (初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² | day1 RT: | 7日間 | 最小度 |